


Derivación Biliopancreática (DBP)

TIPO DE PROCEDIMIENTO – MALABSORTIVO

DESCRIPCIÓN:

- Aproximadamente el 80 % del estómago es removido
- Restringe la ingesta de alimentos y reduce la acidez
- Divide el intestino delgado
- Una extremidad es anastomosada a la bolsa estomacal para crear un canal para la alimentación
- El alimento se mueve a través del canal alimentario con poca absorción del mismo

Ilustración de Derivación Biliopancreática (DBP)



RESULTADOS:

- Los pacientes estudiados consiguieron pérdida del 74 % del exceso de peso en un año, 78 % en dos años, 81 % en tres años, 84 % en cuatro años y 91 % en cinco años.
- Produce altos índices de mala absorción
- Los pacientes pueden comer mayor volumen de alimentos que en el procedimiento restrictivo

RIESGOS:

- Todas las cirugías tienen asociadas un cierto nivel de riesgo. Los riesgos y las consideraciones que siguen son específicos para este procedimiento:
 - Será necesario un período de adaptación, pues las evacuaciones podrán ser muy líquidas y frecuentes.
 - Podrán mejorar o no con el paso del tiempo
 - Distensión abdominal y evacuaciones o gases con mal olor
 - Necesidad de suplemento vitamínico por toda la vida
 - Alto riesgo de formación de cálculo biliar, y por lo tanto la remoción de la vesícula biliar
 - Irritación intestinal y úlcera
 - Posibilidad de sufrir síndrome de dumping al ingerir dulces, líquidos altamente calóricos o productos lácteos.